

春季奶牛常见病防治

杨文晋

1.防治酮尿病

本病重在预防,即改善饲养管理,增加青干草和青绿多汁饲料喂量,减少碳水化合物类精料,特别在怀孕中期就开始直到产后均不饲喂过多精料。同时在饲料中经常添加 0.7%~1%的碳酸氢钠,降低酸中毒和酮病的发病率。其次要重视饲料品种的多样化,减少含脂肪多的饲料。对病牛应及时注射可的松 1g~1.5g 或促皮质激素 200 单位~400 单位,每日一次,同时静注 20%~50% 葡萄糖 300ml~500ml,每日一次,对消化不良、反刍不足的要及时健胃,对昏睡患牛要注射苯甲酸钠咖啡因。

2.防治骨软症

要经常饲喂石灰碱化饲料,同时喂给食盐煮黑豆。病牛用陈石灰 0.5kg、黑豆 15kg,混合粉碎,每日喂牛 1kg。或骨粉 30g,一次喂给,每天三次。用 10%氯化钙注射液 100ml 静注,每日或隔日一次,连续应用。或碳酸钙 40g,清鲜肝油 30ml,每日一次内服,连续应用。

3.防治前胃弛缓

在平时要注意合理搭配精粗饲料,定时定量饲喂,增加运动量。对于病牛可用大枣(去核) 200g、焦山楂 250g、炒神曲 250g、小米 500g、食盐 50g,水煎一次灌服。或大蒜酊 80ml,加水 4 倍灌服。并取健康牛反刍时口中倒出的草,入病牛口中,让其吞咽下去。

4.防治伤风感冒

要注意牛舍保暖和卫生,防止突然受凉。对患病的牛可用生姜 200g、大蒜 200g、茅草根 200g,水煎一次灌服。同时用 30%安乃近 30ml,一次肌注。

5.防治红薯黑斑病中毒

如果奶牛吃了黑斑病红薯,重者在 1 天~2 天内死亡,轻者可延至 10 余天。为此要加强管理,防止误食带有黑斑病的红薯。对患牛在病初要立即放静脉血 2000ml 左右;并用绿豆 250g、甘草 200g、茶叶 200g,水煎一次灌服。或用硫酸镁 500g,葡萄糖粉 500g、高锰酸钾 5g,用温开水一次冲服。